

Daten und Rezeptur zu Methadon

Methadonlösung zur Schmerztherapie

Methadon-Hydrochlorid 1g = DL Methadon
Kaliumsorbat 0,14g
Zitronensäure wasserfrei 0,07g
Aqua purificata ad 100ml
in Pipettenflasche
gemäß schriftlicher Anweisung

Start für Morphinnaiver Pat.:

2 x 5 Tr. 1. Tag 8:00 und 20:00 Uhr, dann 2 x 10 Tr. 2. Tag, dann 2 x 20 Tr. 3. Tag etc. bis Schmerz weg (oben offen!) - ab mehr als 40 Tr. pro Dosis, 3 x täglich

Vorgehen bei Umstellung von Pflaster:

Pflaster 25 - 50yg: um 17:00 Uhr entfernen, um 20:00 Uhr 20 Tr. Methadon und am nächsten Tag 20 Tr. morgens, wenn nicht ausreichend am Abend dann 30 Tr. etc. - s.o.

Pflaster 75– 150 yg: 40 Tr. 2x täglich sonst wie oben

Pflaster 200– 300yg: 40-50 Tr. 3x täglich sonst wie oben

Dr. med. Hans-Jörg Hilscher MAE
<http://pkdnil.de/methadon>